

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА DUTRION для ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТОВ

✓ ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАТОЧНОГО РАСТВОРА:

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАСТВОРА НАДЕТЬ РЕСПИРАТОР, ПЕРЧАТКИ,
НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ!**

1. В чистую канистру объёмом 30 л с крышкой налить 30 л воды комнатной температуры **(вода не должна быть горячей!)**
2. Медленно высыпать упаковку таблеток Dutrion 500 гр.
3. Закрыть плотно крышкой и оставить на 30 минут.
4. Раствор готов к использованию.

✓ ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

1. В чистую канистру с крышкой налить 10 л воды комнатной температуры **(вода не должна быть горячей!)**
2. Добавить 1 л маточного раствора Dutrion.
3. Закрыть плотно крышкой и встряхнуть канистру.
4. Раствор готов к использованию.

ОБРАБОТКУ СОСКОВ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ ПРОВОДИТЬ КАЖДОЕ ДОЕНИЕ

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ:

1. Очистка сосков от механической грязи (с помощью влажной продезинфицированной салфетки – **при необходимости**).
2. Сдаивание «первых струек».
3. Дезинфекция сосков вымени с помощью доильного стаканчика с обратным клапаном (только **после сдаивания первых струй**). Время экспозиции средства на вымени 30 секунд (интервал 3 коровы).
4. Обтирание сосков насухо **одноразовой или многоразовой индивидуальной** салфеткой - не ранее, чем **через 30 секунд** после дезинфекции.
5. Надевание аппарата. Доение.
6. Дезинфекция сосков вымени с помощью доильного стаканчика с обратным клапаном. Время экспозиции средства на вымени 30 секунд.

ВАЖНО: СДОИТЬ ПЕРВЫЕ СТРУЙКИ ДО ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУКИ ДОЯРКИ НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ СОСКОВ.